

## Krem ginekologiczny

# 13

Rp.	
Clotrimazoli pulvis	1,0
Benzocaini	2,0
Lekobazae Amara	ad 100,0
M.f. cremor	

**Praktyczna porada:** Clotrimazol podany na błonę śluzową pochwy nie wchłania się i nie zaburza fizjologicznej flory. Jednak uwaga – może uszkadzać środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (w trakcie terapii i do 5 dni po jej zakończeniu).



### Receptura apteczna – lek szyty na Twoją miarę!

- > Prezentowane przepisy na leki recepturowe zostały zebrane i opracowane przez Przedstawicieli Medycznych Zakładu Farmaceutycznego Amara przy współpracy mgr farm. Zdzisława Macieja Gawrońskiego – specjalistę I stopnia w zakresie farmacji aptecznej.
- > Zwracamy uwagę, że zamieszczone przepisy na leki recepturowe, są jedynie przykładem możliwości technicznych wykonania postaci leku, natomiast decyzję odnośnie składu, stężenia substancji czynnych oraz zastosowania u konkretnego pacjenta – podejmuje lekarz, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

# AMARA

RECEPTURY APTECZNE

# GINEKOLOGIA

1

**Maść odkażająca z Vit. A**

Rp.	
Vit. A	<b>5 tys. j.</b>
Acidi borici	<b>0,2</b>
Vaselini albi	<b>ad 100,0</b>
M.f. ung.	

**> D.S. zewnątrznie**

3

**Globulki o szerokim spektrum działania w zakażeniach ginekologicznych**

Rp.	
Furagini	<b>0,05</b>
Nystatyni	<b>200 000 j. !</b>
Lactosi	<b>0,2</b>
But. Cacao	<b>q.s.</b>
M.f. glob. vag.	
D.t.d. No 12	

**> D.S. 1x1 dopochwowo****Globulki do stosowania przy zakażeniach grzybiczych w połączeniu z antybiotykiem o szerokim spektrum działania**

2

Rp.	
Augmentini	<b>0,370</b>
Nystatyni	<b>100 000 j.</b>
Lactosi	<b>0,2</b>
But. Cacao	<b>q.s.</b>
M.f. glob. vag.	
D.t.d. No 12	

**> D.S. dopochwowo 1x na noc****Maść działająca przeciwświądowo i przeciwgrzybiczo**

4

Rp.	
Vit. A	<b>200 tys. j.</b>
Nystatyni	<b>200 tys. j.</b>
Anaesthesini	<b>2,0</b>
Vaselini albi	<b>ad 100,0</b>
M.f. ung.	

**> D.S. zewnątrznie**

5

### Sterydowe przeciwbakteryjne i przeciwzapalne czopki w szczególności do stosowania w przypadku zakażeń bakteriami beztlenowymi

Rp.	
Metronidazoli	0,5
Papaverini	0,04
Encortolon	0,04
But. Cacao	q.s.
M.f. supp. analia	
D.t.d. No 12	

7

### Globulki o szerokim spektrum działania w zakażeniach ginekologicznych

Rp.	
Furagini	0,1
Metronidazoli	0,3
Vit. A	
Acidi Borici	aa 0,2
M.f. glob. vag.	
D.t.d. No 12	

> D.S. dopochwowo

### Globulki o szerokim spektrum działania w zakażeniach ginekologicznych

6

Rp.	
Chloramphenicoli	0,25
Metronidazoli	0,5
Nystatini	100 000 j.
Acidi borici	0,02
Lactosi	0,2
Vit. A liq.	0,1
Cacao olei	q.s.
M.f. glob. vag.	
D.t.d. No 12	

> D.S. dopochwowo

### Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu grzybiczego zapalenie pochwy i sromu

8

Rp.	
Nystatini	100 000 j.
Cacao olei	q.s.
M.f. globuli vaginales	
D.t.d. No XII	

> D.S. 1 globulka przed snem

9

## Preparat przeciwnieinfekcyjny z grupy pochodnych imidazolu stosowany miejscowo (dopochwowo) w leczeniu zakażeń bakteryjnych i pierwotniakowych.

Rp.	
Metronidazoli	0,4
Vit. A liq.	0,2
Cacao olei	q.s.
M.f. glob.vag.	
D.t.d. No XII	

> D.S. 2x dziennie 1 globulkę

## Globulki o szerokim spektrum działania w zakażeniach ginekologicznych

10

Rp.	
Gentamycini	0,08
Metronidazoli	0,5
Acidi borici	0,2
Lactosi	0,25
Cacao olei	q.s.
M.f. glob. vag. D.t.d No XII	

> D.S. Globulkę 1 raz dziennie do pochwy

**Praktyczna porada:** Gentamycyna jest antybiotykiem aminoglikozydowym. Ma działanie bakteriobójcze. Działa, blokując syntezę białek bakteryjnych. Lek ma wpływ na liczne bakterie, takie jak: enterobakterie (Enterobacteriaceae), Campylobacter, Brucella, Pasteurella, Francisella, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Staphylococcus. W połączeniu z Metronidazolem poszerza spektrum działania.

11

## Globulki o szerokim spektrum działania w zakażeniach ginekologicznych

Rp.	
Augmentin	0,370
Nystatyni	100 000 j.m.
Metronidazol	0,5
Lactosi	0,3
Cacao olei	q.s.
M.f. glob. vag. D.t.d. No XII	

> D.S. 1 globulka na noc

**Praktyczna porada:** Augmentin zawiera amoksycylinę, antybiotyk beta-laktamowy o szerokim spektrum działania oraz kwas klawulanowy, związek który hamuje aktywność enzymów bakteryjnych powodujących rozkład amoksycyliny. Do stosowania ogólnego w leczeniu zakażeń bakteryjnych. W połączeniu z Nystatyną i Metronidazolem poszerza spektrum działania

## Globulki o szerokim spektrum działania w zakażeniach ginekologicznych

12

Rp.	
Amoxicillini	0,124
Lactosi	0,2
Cacao olei	q.s.
M.f. glob. vag. D.t.d. No XXIV	

> D.S. 1 globulka co 12h

**Praktyczna porada:** Amoksycylina stanowi pochodną penicyliny, dlatego wyróżnia się szerokim zakresem działania. Stosowana w zapalenia dróg moczowo-płciowych.