

Szczegółowy opis substancji sporządzono na podstawie FP XII 2020, Warszawa 2021; t.III
 ^^ opracowano na podstawie Kart Charakterystyk Produktów Leczniczych, zawierających w składzie poszczególne surowce

Substancja czynna		Działanie	Przeciwwskazania ^^	Droga podania	Dawka [g]			
Nazwa łacińska	Nazwa polska				Zwykła stosowana		Maksymalna	
					Jednorazowa	Dobowa	Jednorazowa	Dobowa
Acidum acetylsalicylicum	Kwas acetylosalicylowy	inhibitor cyklooksygenazy; przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, antyagregacyjne*	Uczulenie na salicylany; ^^ciężka niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek, skaza krwotoczna, napady astmy oskrzelowej (w przeszłości wywołane podaniem salicylanów); choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy	doustnie	0,5 - 1,0 *0,03 - 0,15	1,0 - 3,0 *0,03 - 0,15	1,0	3,0
Acidum boricum	Kwas borowy	Słabe przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze; tylko do użytku zewnętrznego	Nie stosuje się wewnętrznie ze względu na działanie neurotoksyczne i możliwość kumulacji w organizmie; ^^Nie stosować u dzieci (szczególnie poniżej 4. rz.), na duże lub sączące się rany, rozległe zmiany zapalne ani duże powierzchnie.	zewnętrznie	roztwór: 1,0% - 3,0% maść: 1,0% - 10,0% maść do oczu: 3,0% zasyпка: 1,0% - 10,0%			
Acidum lacticum	Kwas mlekowy	Ściągające, przyzegające	Nie stosować w uczuleniu na kwas mlekowy; Nadwrażliwość na kwas mlekowy, podrażnienia.	zewnętrznie	do przepłukiwań: 0,5% - 2,0% do pędzlowania: 10,0% - 20,0% do przyzegania: 20,0% - 50,0% na słuzówkę: 0,5% dopochwowo (roztwory): 0,5%			
Acidum salicylicum	Kwas salicylowy	Antyseptyczne, keratolityczne*	Nadwrażliwość na salicylany lub inne NLPZ, czynna choroba wrzodowa, astma aspirynowa, wrodzone i nabyte skazy krwotoczne, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.	zewnętrznie	1,0% - 3,0% *10,0%		10,0% *50,0%	
Acidum tannicum (Tanninum)	Tanina	Silnie ściągające; działanie słabo odkażające, hemostatyczne, zmniejszające stan zapalny, hemostatyczne.	Nadwrażliwość na taninę. ^^Nie stosować u dzieci poniżej 4 r. życia.	doodbytniczo zewnętrznie	0,05 0,25 wlew doodbytniczy: 0,5% roztwór: 1,0% - 20,0% maść: 0,5% - 10,0%			
Adonidis vernalis tinctura	Nalewka z ziela mlka wiosennego	Słabe i krótkotrwałe działanie zwiększające siłę skurczu mięśnia sercowego i zwalniające jego czynność.	Uczulenie na którykolwiek składnik nalewki, farmakoterapia innymi preparatami o tym samym kardiologicznym profilu działania.	doustnie	1,0 wg FP IV	3,0 wg FP IV	3,0 wg FP IV	10,0 wg FP IV
Alumini subacetatum solutum	Płyn Burowa / Kwaśna woda	Ściągające, przeciwzapalne. Wskazania: sftuczenia, obrzęki stany zapalne	Nie stosować na otwarte rany		Stosowany głównie do okładów w rozcienieniu 1:3 - 1:2			
Ammonium bituminosulfonicum / Ichtammolum (Ichtfol)	Ichtamol / ichtiol	Słabo odkażający, drażniący, przeciwzapalny i przeciwobrzękowy; stosowany w dermatologii	Uczulenie na ichtiol; nie stosować na uszkodzoną skórę.	zewnętrznie	do przemywań: 1,0% - 5,0% na skórę: 2,0% - 15,0% maść: 10,0% - 15,0%			
Ammonium bromatum	Amonu bromek	Silnie uspokajający, ułatwia zasypianie, duże dawki hamują napady padaczkowe.	Gruźlica, stany zapalne przewodu pokarmowego.	doustnie	-	-	-	0,5 UWAGA: dla preparatów zawierających więcej niż jedną sól bromkową, maksymalna łączna dawka dobowo - 1,0 (w tym bromku amonowego maksymalnie 0,5)
Argentii nitras	Srebra azotan	Bakteriobójcze, przyzegające, odkażające, ściągające.		zewnętrznie	na skórę: 1,0% - 2,0% do przepłukiwań: 0,05% - 0,1% do worka spojówkowego: 0,1% - 0,5% noworodkom: 1,0% 1 kropla do worka spojówkowego do pędzlowania jamy ustnej: 1,0% - 2,0% w stomatologii: 10,0% - 20,0%			
Balsamum peruvianum	Balsam peruwiański	słabo odkażający		zewnętrznie	maść: 5,0% - 10,0%			
Benzocainum (Anaestbesinum)	Benzokaina / Anestezyna	Miejscowo znieczulające	Nadwrażliwość na benzokainę.	zewnętrznie	roztwór: 1,0% - 3,0% maść: do 10,0% zawiesina: do 5,0%			
Bismuthum subcarbonicum	Bizmutu węglan zasadowy	Ściągające; Osłaniające i zobojętniające nadmiar kwasu w żołądku		doustnie	0,50	1,50	1,00	3,00
Bismuthum subgallicum (Dermatol)	Bizmutu galusan zasadowy	Odkażające, ściągające; Stosowany jako środek wysuszający i osłaniający.		doodbytniczo zewnętrznie	0,2 - 0,4 zasyпка: 25,0% - 100,0% maść: 20,0%	0,4	-	-
Bismuthum subnitricum	Bizmutu azotan zasadowy	Ściągające, przeciwzapalne, wysuszający, osłaniający.		zewnętrznie	zasyпка: 10,0% - 20,0% maść: 5,0% - 20,0%			
Calcium carbonicum praecipitatum	Wapnia węglan	Zapobieganie niedoborom wapnia, zapobiegawczo w osteoporozie; Stosowany zewnętrznie: ściągający i wysuszający.	Niewydolność nerek, kamica nerkowa.	doustnie doustnie zewnętrznie	0,4 - 0,8 - -	1,2 1,2 -	- -	- -
Calcium chloratum hexahydricum	Wapnia chlorek sześciowodny	Przeciwwrótoczne, przeciwsładowe, przeciwwysięgłowe, niedobory wapnia w organizmie.	Uszkodzenie nerek i niewydolność nerek, kamica nerkowa, terapia glikozydami naparstnicy.	dożywnie (wlewy)	-	1,0	2,0	2,0
Calcium gluconicum	Wapnia glukonian	Zapobieganie niedoborom wapnia	Uszkodzenie nerek i niewydolność nerek, kamica nerkowa, terapia glikozydami naparstnicy.	doustnie	0,5 - 1,0	3,0 - 6,0	-	-
Calcium lacticum	Wapnia mleczan	Zapobieganie niedoborom wapnia	Uszkodzenie nerek i niewydolność nerek, kamica nerkowa, terapia glikozydami naparstnicy.	doustnie	0,5 - 1,0	1,0 - 4,0	-	-
Camphora	Kamfora	Rozgrzewające, słabo przeciwsładowe; wywołuje miejscowe przekrwienie, lekko znieczulające.	Uczulenie na kamforę i pochodne.	zewnętrznie	maść: 1,0% - 10,0% roztwór: 1,0% - 10,0%			
Capsici tinctura	Nalewka z owoców pieprzowca	Rozszerza naczynia krwionośne skóry. Stosowana jest wyłącznie zewnętrznie w bólach mięśniowych i reumatycznych. Wchodzi także w skład wcierek do skóry głowy stosowanych przy nadmiernym wypadaniu włosów. Miejscowo rozgrzewające i drażniące.	Uczulenie na kapsaicynę.	zewnętrznie	do nacierań 1,0 - 15,0%			
Chloramphenicolium (Detreomycyna)	Chloramfenikol / Detreomycyna	Antybiotyk; przeciwbakteryjne Wskazania: miejscowe leczenie ropnych chorób skóry zakażonej drobnoustrojami opornymi na leczenie innymi antybiotykami.	Współistniejąca grzybica, odczyn alergiczny, łuszczyca, nie stosować u dzieci i kobiet w ciąży. ^^Nadwrażliwość na detreomycynę, schorzenia wątroby, schorzenia szpiku kostnego w wywiadzie, ciężkie zaburzenia czynności nerek, zaburzenia hemopozy w wywiadzie, nieprawidłowy skład krwi w wywiadzie. Nie stosować u kobiet ciężarnych, karmiących piersią, ani u dzieci do 11 lat.	doustnie domięśniowo zewnętrznie	0,5 0,5 maść: 2,0% maść do oczu: 1,0% krople do oczu: 0,5%	2,0 2,0	0,75 1,0	3,0 3,0

Codeinum phosphoricum	Kodeiny fosforan półwodny	Przeciwkaszłowe, przeciwbólowe	U dzieci poniżej 1 roku życia: kaszel z ropną wydzieliną, stosowanie inhibitorów MAO; zaparcia; ^astma oskrzelowa, niewydolność oddechowa, zaburzenia oddychania; uzależnienie od opioidów, śpiączka; kodeina uzależnia psychicznie i fizycznie; nie może być stosowana w sposób ciągły ani u dzieci poniżej 12. roku życia.	doodbytniczo	0,03	0,06	0,06	0,24
				doustnie	0,03	0,06	0,06	0,24
Coffeinum anhydricum	Kofeina bezwodna	pobudzające	Nadciśnienie, dusznica bolesna, bezsenność, nerwice Nie stosować u dzieci. Cięża i okres karmienia piersią.	doustnie	0,1 - 0,2	0,3 - 0,5	0,3	1,5
Cuprum sulfuricum	Miedzi siarczan	Doustnie: w niedoborach miedzi; drażniąco na układ pokarmowy-wymiotnie; Zewnętrznie: przeciwgrzybiczo, bakteriobójczo, ściągająco, w większych stężeniach żrąco; Wskazania: grzybnice jamy ustnej i skóry, do przemywania ran		doustnie	0,5 mg	1,5 mg	-	-
				zewnętrznie	-	-	-	-
Dithranolum	Ditranol / Cignolina	keratolityczne; UWAGA! silne działanie drażniące; Wskazania: grzybnice, liszaje, łuszczyca	Uczulenie na związki fenolowe, choroby nerek, stany zapalne skóry, niedokrwistość. ^^Nie stosować z kortykosteroidami	zewnętrznie	roztwór, maść 0,1% - 0,5% (do 30 min.)	roztwór, maść: 1,0% - 3,0%	-	-
Ephedrinum hydrochloricum	Efedryny chlorowodorek	Sympatykomimetyk; rozszerzające oskrzela, zwięzające naczynia krwionośne; podnosi ciśnienie krwi, działa analeptycznie, zwiększa stężenie katecholamin, pobudza psychicznie, obkurcza naczynia śluzówki nosa, rozszerza źrenice. Wskazania: dychawica oskrzelowa, moczenie noce, zatrucia morfina i barbituranami, stany zapalne śluzówki nosa.	Choroba wiekowa, nadciśnienie, nadezność tarczycy.	doustnie	0,025	0,05 - 0,1	0,05	0,15
				domięśniowo	0,025	0,05 - 0,075	-	-
				zewnętrznie	krople i maść do nosa: 0,5% - 1,0%		-	-
Erythromycinum	Erytromycyna	Przeciwbakteryjne; Antybiotyk makrolidowy o działaniu bakteriostatycznym, w większych dawkach działa również bakteriobójczo. Wskazania: zakażenia bakteryjne	Nadwrażliwość na antybiotyki z grupy makrolidów, ciężkie uszkodzenie wątroby.	doustnie	0,2 - 0,25	1,0	1,0	4,0
				zewnętrznie	maść: 1,0% może do 0,5%		-	-
				doustnie	0,2 - 0,25	1,0	1,0	4,0
Ethacridini lactas	Etakrydyny mleczan / Riwanol	Przeciwbakteryjne, odkażające; Zastosowanie: w leczeniu uporczywego trądziku, lojotoku oraz atopowego zapalenia skóry; w czyrakach, ropniach, ciemniuszce, otarciach naskórka, oparzeniach, owrzodzeniach oraz innych starych zapalnych skóry. Do dezynfekcji skaleczeń; trudno gojących się, ropięjących ran (przymoczek, okłady)	Kobiety w ciąży i okresie laktacji.	zewnętrznie	roztwór: 0,01% - 0,2% maść i zasyпка: 0,5% - 2,5%		-	-
Formaldehydum 35%	Formaldehyd	Środek dezynfekujący; Silnie odkażające (wywołujące martwicę tkanki), przeciwropne, ściągające. Zastosowanie: jako środek dezynfekujący; w niższych stężeniach wchodzi w skład preparatów przeciwropnych.	Kobiety w ciąży i okresie laktacji, silnie podrażnia drogi oddechowe	zewnętrznie	-	-	-	-
Gentamycini sulphas	Gentamycyny siarczan	Antybiotyk aminoglikozydowy o działaniu przeciwbakteryjnym (bakteriobójcze)	Uczulenie na antybiotyki z grupy aminoglikozydów, uszkodzenie nerek, może powodować uszkodzenie nerwu słuchowego	domięśniowo / dożylnie	0,08	3 mg/kg masy ciała	-	5 mg/kg masy ciała
				zewnętrznie	maść: 0,1% - 0,3% maść do oczu: 0,3% roztwór: 0,3%		-	-
Hydrocortisoni acetat	Hydrokortyzonu octan	Glikokortykosteryd; przeciwzapalnie, łagodzi obrzęki i świąd skóry, przeciwuczuleniowo. Wskazania: stany zapalne, wypryski, wysypki alergiczne, ukąszenia owadów, w leczeniu hemoroidów.	Cięża i kobiety karmiące, u noworodków nie zaleca się stosowania hydrokortyzonu.	zewnętrznie	0,25% - 2,5%		-	-
				doustnie	0,01	0,02	0,02	0,06
Hydrogenium peroxysdatum 30% / Perhydrol	Wodoru nadtlenek 30% / Perhydrol	Przyzégające; do przygotowywania preparatów farmaceutycznych		zewnętrznie	w roztworach: do 3% do płukania jamy ustnej: 0,2% - 0,3%			
Hydrogenium peroxysdatum 3% / Woda utleniona	Wodoru nadtlenek 3% / Woda utleniona	Odkażające; do przygotowania preparatów farmaceutycznych Wskazania: odkażanie ran, do płukania gardła w stanach zapalnych, w kosmetyce do maści wybielających.		zewnętrznie	na skórę do 3%; na błony śluzowe: w rozcieńczeniu 1:2			
Lidocainum hydrochloricum	Lidokainy chlorowodorek	Miejscowo znieczulające i antyarytmiczne; Wskazania: do znieczulenia miejscowych i infiltracyjnych.		domięśniowo	0,05 - 0,1	-	-	-
				dożylnie (wlewy)	0,05 - 0,1	0,4	0,25	1,0
				do znieczulenia: infiltracyjnych przewodowych	roztwory: 0,25% - 0,5% 1,0% - 2,0%		-	-
Magnesium subcarbonicum	Magnezu węglan	Zobojętniające, adsorbujące, w małych dawkach zapierające. Wskazania: nadkwaśność, choroba wrzodowa		doustnie	0,5	2,5	2,0	6,0
				Magnesium oxydatum	Magnezu tlenek	Zobojętniające, adsorbujące, w małych dawkach zapierające. Wskazania: nadkwaśność, choroba wrzodowa	doustnie	0,25 - 0,5
Magnesium sulfuricum	Magnezu siarczan	Przeczyszczające przeciwdrgawkowe, przeciwarytmiczne; Wskazania: zaparcia, kamica żółciowa.	doustnie				10,0 - 20,0	10,0 - 20,0
			domięśniowo	2,0 - 10,0	roztwór: 20,0%	-	-	
				dożylnie (wlewy)	1,0 - 10,0	-	-	-

Menthae piperitae tinctura	Nalewka mietowa / Krople mętowe	Wiatropędnie, rozkurczajaco na przewod pokarmowy, przeciwywiotmie, poprawia procesy trawienia. Wskazania: brak łaknienia, niestrawność, wzdęcia, wymioty.	Uczulenie na miętę pieprzową; nie powinno się podawać dzieciom do 6 roku życia ze względu na drażniące działanie mentolu na drogi oddechowe.	doustnie	-	-	-	-
Mentholum	Mentol	Miejscowo znieczulające, przeciwywiotdowe; Pobudza zakończenia nerwe powodując uczucie chłodu, słabe znieczulające miejscowo; Wskazania: nerwobole, pokrzywki skórne, stany zapalne błon śluzowych gardła.	Uczulenie na mentol; nie stosować u osób z niewydolnością 6 roku życia.	zewnątrznie	na błony śluzowe: 0,3% na skórę: do 10%			
Metamizolum natrium	Sodu metamizol / Pyralgina	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, słabo przeciwzapalne, rozkurczowe Wskazania: klasyczny lek przeciwgorączkowy, bóle różnego pochodzenia również pooperacyjne, do stosowania doraźnego w krótkotrwałym leczeniu.	Nie stosować przewlekle. Nie stosować u osób z niewydolnością nerek, zaburzeniami w obrazie krwi, u osób z niewydolnością wątroby.	domięśniowo dożylnie doodbytniczo doustnie	0,5 0,5 0,75 0,5 - 1,0	1,0 1,0 1,5 2,0	1,0 2,5 0,75 0,5	3,0 2,0 3,0 2,0
Metronidazolium	Metronidazol	przeciwbakteryjne (bezielenowe), przeciwpierwotniakowe	Ciąża, skaza krwotoczna.	dopochwowo doodbytniczo doustnie dożylnie (powolne wlewy)	0,5 1,0 0,5 0,5	1,0 1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0 1,0	1,5 2,0 2,0 4,0
Morphinum hydrochloricum	Morfiny chlorowodorek / Dionina	Silne przeciwbólowe, depresyjnie na ośrodek nerwowy i oddechowy; znosi perystaltykę powoduje zaparcia, zwięża żrenice, zmniejsza diurezę. Wskazania: silne bóle, bóle pooperacyjne i medycyna paliatywna. *w zaawansowanej chorobie nowotworowej	Niewydolność oddechowa, dychawica oskrzelowa, zmiany wątrobowe, uzależnienie od opiatów. ^^Dawkowanie indywidualnie ustalane przez lekarza - powoduje silne uzależnienie i przyzwyczajanie.	doustnie doodbytniczo podskórnie domięśniowo dożylnie	0,005 - 0,02 0,015 0,005 - 0,01 0,005 - 0,01 0,005 - 0,01	0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 - 0,02	*0,1 0,03 *0,06 0,02 0,01	*0,1 0,1 *0,06 0,06 0,06
Natrium benzoicum	Sodu benzoosan	Wykrztuśne, antyseptyczne, sekretolityczne; Wskazania: nieżyty górnych dróg oddechowych.	Nadwrażliwość na kwas benzoosowy.	doustnie	0,3 - 1,0	3,0	-	-
Natrium biboricum (tetraboricum)	Boraks	W pleśniawkach; Antyseptyczne, ściągające, grzybobójcze. Wskazania: dezynfekcja błon śluzowych, pleśniawki.	Niewydolność nerek, uszkodzenia błony śluzowej żołądka i jelit.	zewnątrznie	płyn do pedzłowania: 20,0%			
Natrium bicarbonicum (hydrogencarbonicum)	Sodu wodorowęglan	alkalizujące, do wyrównania kwasicy; zobojętnia sok żołądkowy, silnie alkalizujący, zwiększa sekrecję w drogach oddechowych. Wskazania: kwasica metaboliczna, nieżyty błon śluzowych.	Alkalozja metaboliczna, retencja sodu.	doustnie dożylnie zewnątrznie	0,15 - 1,5 1 mEq/kg masy ciała roztwór: 1,0% - 4,0%	2,0 - 5,0	-	- 3 mEq/kg masy ciała -
Natrium bromatum	Sodu bromek	Uspokajające, przeciwdrgawkowe, ułatwia zasypianie. Wskazania: nadmierna pobudliwość nerwowa, napady drgawek, nadczynność tarczycy.	Uczulenie na brom, niewydolność nerek.	doustnie	-	-	-	1,0 UWAGA! dla preparatów zawierających więcej niż jedną sól bromkową maksymalna łączna dawka dobowo: 1,0 (w tym bromku amonowego maksymalnie 0,5)
Natrium chloratum	Sodu chlorek	Roztwór izosmotyczny. Elektrolit - utrzymuje ciśnienie osmotyczne osocza i płynów pozakomórkowych.	Retencja sodu i wody.	dożylnie	0,9%	-	-	-
Natrium salicylicum	Sodu salicylan	Przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, przeciwzapalny, antyseptyczny; zmniejsza agregację płytek krwi, działa żółciopędnie, moczopędnie oraz słabo uspokajająco Wskazania: choroby reumatyczne, nieżyty górnych dróg oddechowych, przeziębienie, grypa, angina.	Nadwrażliwość na salicylany, choroba wrzodowa, uszkodzenia szluzówki przewodu pokarmowego, uszkodzenia wątroby i nerek.	doustnie zewnątrznie	0,5 - 1,0 wg FPIV do 1,0%	10,0 wg FPIV	2,0 wg FPIV	12,0 wg FPIV
Neomycini sulphas	Neomycyny siarczan	Antybiotyk aminoglikozydowy, przeciwbakteryjne; Wskazania: biegunki bakteryjne, w okulistyce, zakażenia bakteryjne skóry i trudno gojące rany, oparzenia. *przed zabiegiem chirurgicznym	Uczulenie na antybiotyk aminoglikozydowy.	doustnie zewnątrznie	0,25 aerazol: 0,5% maść: 3,0% maść do oczu: 0,5%	1,0 - 4,0	1,5	6,0 *8,4
Nystatinum	Nystatyna	Antybiotyk przeciwgrzybiczy, ze wchłania się z przewodu pokarmowego, niska toksyczność. Wskazania: grzybie i drożdżycy jamy ustnej i przewodu pokarmowego, pochwy oraz skóry. Profilaktyka w antycholoterapii doustnej	Uczulenie na nystatynę.	doustnie dopochwowo zewnątrznie	500 000 j.m 1 500 000 j.m 100 000 j.m/g	1 000 000 j.m	1 000 000 j.m	6 000 000 j.m 200 000 j.m -
Papaverinum hydrochloricum	Papaweryny chlorowodorek	rozkurczające mięśnie gładkie; zwiększa przepływ włośniowy, mózgowy, płucny; znosi stany spastyczne oskrzeli, dróg żółciowych i układu moczowego.	Jaska.	podskórnie, domięśniowo doustnie	0,04 - 0,08 0,04 - 0,1	0,12 do 0,3	0,1 0,2	0,2 0,6
Paraffinum liquidum	Parafina ciekła	przecyszczające, osłaniające na szluzówkę jelit; środek zmiękczejący		doustnie zewnątrznie	15	-	30	-
Phenobarbitalium (Luminalum)	Fenobarbital / Luminal	przeciwpadaczkowe, nasenne		domięśniowo doustnie	0,1 - 0,2 0,1	- 0,3	0,3	0,6 0,6
Phenobarbitalium natrium (Luminalum natrium)	Fenobarbital sodowy	przeciwpadaczkowe; Wskazania: nadmierna pobudliwość nerwowa, bezsenność, w małych dawkach zmniejsza poziom bilirubiny we krwi	Choroba wieńcowa, miastenia, zaburzenia czynności nerek i wątroby, ciąża i okres karmienia.	domięśniowo, dożylnie doustnie	0,1 - 0,2 0,1	0,4 0,3	0,3	0,6 0,6
Pilocarpinum hydrochloricum	Pilocarpiny chlorowodorek	cholinomimetyk; w jaskrze; pobudza zakończenia nerwów parasympatycznych, pobudza wydzielanie śliny i potu. Wskazania: jaskra, zatrucie atropiną, na nowotwórców	Ciąża i okres karmienia, dychawica oskrzelowa, stany spastyczne mięśni gładkich.	doustnie podskórnie	0,01 - 0,015 0,005 - 0,01	0,01	0,02	0,04 0,02

				zewnetrznie	krople do oczu: 1,0% - 4,0% masę do oczu: 2,0%	-	-
Prednisolonum	Prednizolon	glikokortykosteroid; przeciwwzapalne, przeciwalergiczne, immunosupresyjne; Wskazania: stany zapalne i alergiczne.	Grzybice, guzlica, choroby wirusowe.	doustnie	0,0075 - 0,01	0,04 (dawka podtrzymująca)	0,08 (dawka początkowa)
				zewnetrznie	0,25% - 0,5%	-	-
Procaïni hydrochloridum / Polocainum	Prokainy chlorowodorek / Polokaina	miejscowo znieczulajace		zewnetrznie; łędźwiowo domięśniowo dożylnie nasiękowo przewodowo zewnatrzoponowo	roztwory do wstrzykiwań: 2,0% - 4,0% 1,0% - 2,0% 0,1% - 1,0% 0,25% - 0,5% 1,0% - 2,0% 1,0% - 4,0%	-	0,8 2,0 0,5 0,5 0,6 0,6
Resorcinum	Rezorcyna	Keratolityczne, przeciwwzapalne, ściągajace, bakteriobojcze, grzybobojcze. Wskazania: łuszczycy, trędzik, bakteryjne zapalenia skóry, wypryski łojotokowe, grzybice.	Związek toksyczny. Nie stosowac w chorych z niewydolnością wątroby i nerek.	zewnetrznie	masę, pasta: 5,0% - 10,0% roztwór: 1,0% - 5,0%	-	-
Saccharum lactis / Lactosum	Laktoza	Przeczyszczajace. Wskazania: zaparcia u niemowląt i malych dzieci.	Uczulenie na laktozę.	doustnie	wg wieku od 4,0 - 10,0.	-	-
Sulfur praecipitatum	Siarka strącona	Przeciwwierzbowe, przeciwwgrzybice, przeciwbakteryjne, wysuszajace. Wskazania: łojotok, trędzik, świerzb, grzybice i nadmierne łuszczenie się skóry.		zewnetrznie	masę, zasyпка, zawiesina: 5,0% - 30,0%	-	-
Talcum venetum	Talk	Oslaniajace, osuszajace, posilżgowe. Wskazania: wzmożona potliwosc, baza do zasypek i pudrow.		zewnetrznie	Zewnetrznie per se oraz ww pudrach i zasypkach.	-	-
Urea	Mocznik	zmiękczajace, nawilżajace; Działanie zależne od stęzenia: nawilżajaco (2%), zmiękczajaco (15%), keratolityczne (powyżej 30-40%) Wskazania: choroby skóry, alergie		zewnetrznie	10,0% - 30,0%	-	-
Valerianae tinctura	Nalewka z korzenia kozka lekarskiego	Uspokajajace, zmniejsza poziom wosc nerow.	Uczulenie na kozlek lekarski.	doustnie	1,0 - 3,0 wg FP IV 10,0 wg FPIV	-	-
Zincum oxydatum	Cynku tlenek	Ściągajace, osuszajace, przeciwwzapalne. Wskazania: zakażone rany, odleżyny, trędzik, zasyпки przeciwpotne.	—	zewnetrznie	masę, pasta: 15,0% - 25,0%	-	-



